



Vespa- -das-galhas- -do-castanheiro

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

A vespa-das-galhas-do-castanheiro, *D. kuriphilus* é um inseto que se desenvolve nos gomos do castanheiro e provoca a formação de galhas nos ramos e folhas.


Provoca prejuízos muito graves, que podem atingir até 70% da produção de castanha.

Eu sou agricultor. Que devo fazer?

Se plantou castanheiros no último inverno (2016/2017), deve efetuar no mínimo três inspeções aos rebentos até final da 1ª quinzena de maio.

Aos castanheiros plantados no inverno de 2015/2016, caso não tenha feito inspeção no ano anterior ou tenha detetado galhas, deve efetuar no mínimo três inspeções aos rebentos até final da 1ª quinzena de maio. Neste caso, deve observar igualmente os castanheiros circundantes.

Se observar galhas, retire-as todas, meta-as num saco e destrua-as de seguida.



Sr. Agricultor:

Se encontrar galhas da vespa-das-galhas-do-castanheiro, deve informar a sua Junta de Freguesia, dando indicação do local, número de castanheiros atacados e data de plantação.

A sua ajuda é muito importante para o controlo da praga.



**Terras de
Trás-os-Montes**
Comunidade Intermunicipal

Colaboração: Câmaras Municipais/ Juntas de Freguesia/Centro Nacional de Competências dos Frutos Secos/Associações de Agricultores